

Revision Gastric Bypass

Hilfe, ich nehme wieder zu!

Das Einsetzen eines Magenrings



MiniMIZER
RING

 **BARIATRIC**
SOLUTIONS
INTERNATIONAL

Sie hatten eine Magenbypass-Operation, Sie haben viel Gewicht verloren und Sie fühlen sich wieder gesund. Aber dann stellen Sie plötzlich fest, dass Sie wieder zunehmen.

Gründe für eine Gewichtszunahme nach einem Eingriff zur Gewichtsreduktion sind in der Regel unbemerkte Veränderungen Ihres Ess- und Bewegungsverhaltens. Außerdem haben Patienten, die wieder zunehmen, möglicherweise kein ausreichendes Sättigungsgefühl. Das Sättigungsgefühl wird unter anderem durch die neue Verbindung zwischen dem Magen und dem Dünndarm (Anastomose) mitbestimmt. Wenn diese Verbindung zu groß ist oder sich stark vergrößert, fühlen sich Patienten nicht satt und neigen dazu, mehr zu essen.

Sprechen Sie mit Ihrem Chirurgen über das Einsetzen eines MiniMIZER RINGs

Wenn Sie stark zugenommen haben, sind Sie oftmals nicht selbst in der Lage, durch Anpassungen der Lebensweise Ihr Gewicht zu kontrollieren. In diesem Fall kann das Einsetzen eines MiniMIZER RINGs eine mögliche Lösung sein. Sprechen Sie mit Ihrem Chirurgen. Er wird Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob der MiniMIZER RING eine geeignete Lösung für Sie ist, um eine weitere Gewichtszunahme zu verhindern.



**Neustart mit dem
MiniMIZER RING!**



Der neue Weg:

Der Gewichtszunahme
entgegenwirken!

Was ist der MiniMIZER RING?

Der MiniMIZER Ring ist ein zertifiziertes Implantat. Er besteht aus medizinischem Silikon, das vom Körper sehr gut akzeptiert wird.

Bei einer laparoskopischen Reoperation implantiert der Chirurg den MiniMIZER Ring um den unteren Teil des Magenpouches und fixiert ihn, sodass er nicht verrutschen kann.


Wie wirkt sich der MiniMIZER RING aus?

Da der MiniMIZER RING um den verkleinerten Magen gelegt wird, verzögert sich der Durchgang der Nahrung zusätzlich. Dadurch fühlen Sie sich schneller satt und hören früher auf zu essen. So trägt der MiniMIZER RING zu der erwünschten Veränderung Ihrer Essgewohnheiten bei und erleichtert es Ihnen, diese neuen Gewohnheiten langfristig beizubehalten.



Wie lange dauert die Genesung nach dem Einsetzen eines MiniMIZER RiNGs?

Die Genesung dauert genauso lange wie die Genesungszeit nach Ihrer vorherigen Magenbypass-Operation. Durchschnittlich dauert es etwa drei bis sechs Wochen bis zur völligen Wiederherstellung nach dem Eingriff. Beachten Sie, dass es sich dabei um Durchschnittswerte handelt und dass die Genesungszeit abweichen kann.



Die Größe des Rings wird während der Operation individuell angepasst

Auch gegen Dumping anwendbar?

Der MiniMIZER RING kann auch eine Lösung für Patienten sein, die unter einem Dumping-Syndrom leiden (Sturzentleerung). Beim Dumping-Syndrom gelangt sehr zuckerhaltige Nahrung zu schnell vom Magenpouch in den Dünndarm, was zu Kreislaufproblemen und Unterzuckerung führen kann.

Wie sind die Ergebnisse?

Untersuchungen zeigen, dass 75 % der Patienten nach dem Einsetzen eines MiniMIZER RINGs bei gesundem und regelmäßigem Ess- und Bewegungsverhalten kein Gewicht mehr zunehmen. Rund 40 % dieser Patienten verringern ihr Gewicht innerhalb eines Jahres sogar wieder um durchschnittlich bis zu 7 BMI-Punkte.

MiniMIZER
RING

Welche möglichen Nebenwirkungen hat ein MiniMIZER RING?


Eine mögliche Nebenwirkung des MiniMIZER RINGs ist Erbrechen.

Das kann daran liegen, dass der MiniMIZER RING den Durchgang der Nahrung verlangsamt. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie Ihr Essverhalten und Ihre Ernährung entsprechend anpassen. Achten Sie darauf, kleine Bissen zu sich zu nehmen, gut zu kauen und zwischen den Bissen Pausen einzulegen. Dadurch verbessert sich der Nahrungsfluss und das Erbrechen wird verhindert oder reduziert.

Hält das Erbrechen an, obwohl Sie Ihr Essverhalten und Ihre Ernährung angepasst haben, dann sollte der MiniMIZER RING möglicherweise gelockert oder entfernt werden.

Eine äußerst seltene Komplikation ist eine sogenannte Erosion, bzw. Migration. Dabei wandert der MiniMIZER RING aufgrund von Druck an der Magenwand durch diese hindurch. Bei einer vollständigen Erosion kann der Ring in den Magen gelangen. In diesen seltenen Fällen bemerken die Patienten manchmal nichts, sondern stellen vielleicht nur fest, dass sie wieder mehr essen können. Im Falle einer Erosion kann der MiniMIZER RING im Rahmen einer Gastroskopie entfernt werden.





Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implantation des MiniMIZER RINGS nach einem ringverstärktem Magenbypass dazu beiträgt, die erneute Gewichtszunahme aufzuhalten bzw. zu reduzieren und sogar eine weitere Gewichtsabnahme zu ermöglichen. Besprechen Sie die Vorteile des MiniMIZER RINGS mit Ihrem Chirurgen, um festzustellen, ob der MiniMIZER RING für Sie infrage kommt.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite



CE 0483

Deutschlandvertrieb:

innovative⁺
MEDICAL TRADE & SOLUTIONS

www.innovative.de

Zugrundeliegende Daten auf Anfrage erhältlich

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Broschüre ist kein Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung. Lassen Sie sich bei Fragen zu einer Erkrankung immer von Ihrem Arzt oder einem anderen qualifizierten Gesundheits-Dienstleister beraten. Ignorieren Sie niemals professionellen medizinischen Rat auf Grund des Inhaltes, den Sie in dieser Broschüre gelesen haben.
Bariatric Solutions International GmbH - Kaltenbacherstrasse 24 - CH 8260 Stein am Rhein

PE_004_DERev.00